



Pistachio

Salt out	Humic acid	Anti stress/Amino acid	Calcium	Micro Nutrients	Grow up	محصولات
						مرحله رشد
Nutrient FE 40g+Nutrient Zn 50g+Grow up 20.20.20 150-200gr						زمان خواب درخت
محلول پاشی (Foliamel Zn 2L+Foliamel BOR 1L) + 5 کیلوگرم اوره) * 1000 لیتر آب						تورم جوانه- ها (اسفند-بهار)
TRANS X 10 لیتر (کودآبیاری)					Grow up 10.52.10 ۲۰ کیلو (کودآبیاری)	قبل از گلدهی
	FULLMAX 42 ۱۰ لیتر (کودآبیاری)		Foliamel Calnit 3L/1000L (محلول پاشی) تکرار ۱۵ روز بعد در صورت لزوم	Foliamel MIX 1L+ ACTIVATORE 2L/1000L (محلول پاشی)		ارزنی شدن میوه (اردیبهشت)
TRANS X 10 لیتر (کودآبیاری)	EKOMOL 22 ۱۰ لیتر (کودآبیاری)	MD 10 BIOXCIN 3L/1000L (محلول پاشی) + eKots ۱۰ تا ۱۵ لیتر (کودآبیاری)			Grow up 20.20.20 ۲۰ کیلو (کودآبیاری)	آغاز پرشدن مغز (اواسط تیر)
	EKO K HUMITECH 2.5kg (کودآبیاری)	Ronesans 2L/1000L (محلول پاشی)		ECO MIX 3kg/1000L (محلول پاشی)		شروع رسیدگی (اواسط مرداد)
Large combi 3kg+Foliamel Zn 2L+Foliamel CALNIT 3L+ACTIVATOR 2.5L + 5 کیلو اوره/1000 لیتر آب						بعد از برداشت (اواخر شهریور)

- توصیه های ارائه شده در این بروشور کلی و بسته به نوع محصول، سن گیاه، و شدت کمبود متغیر است. توصیه می شود اساس تغذیه را بر مبنای آنالیز خاک و برگ قرار داده و برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه ای یا کارشناسان شرکت مشورت شود.
- در زمان گرده افشانی به هیچ وجه محلول پاشی انجام نشود زیرا افزایش رطوبت در این دوره تاثیر منفی در گرده افشانی درختان پسته دارد.
- محلول پاشی در خنک ترین ساعات روز انجام شود.